

Précautions de la gestion des Trichogrammes

APPLICATION

Si application dans les 24h qui suivent la réception des plaques, stockage dans une atmosphère tempérée : 12-14°C ; cartons non gerbés et ouverts

Si application retardée (supérieure à 24h) par chantier: stockage dans un local réfrigéré 4-6°C ; ne pas stocker à T°<4°C ni autour de 7-8°C (température de diapause) ; cartons non gerbés et ouverts

TRANSPORT

Transport jusqu'à la parcelle: en véhicule climatisé (T° env. 18°C), ne pas fumer (Nicotine = puissant insecticide)

POSITIONNEMENT

Attention aux températures entre 15 et 28°C

- T°>30°C : mortalité œufs, fécondité réduite des femelles, longévité réduite des adultes, réduction de l'activité de parasitisme
- T°>35°C : mort des trichogrammes.

Hygrométrie supérieure à 60%

Pas / peu d'adventices : **gène physique limitant la détection des œufs de pyrale**

Positionnement des plaquettes et capsules à l'ombre des feuilles

Des œufs de pyrale fraîchement pondus (pose au tout début du vol pyrale)

Pas d'insecticide classique dans les 10 jours qui précèdent la pose

La durée de protection est de 3 semaines maximum